



Observatoire National Cynégétique et Scientifique Citoyen



Migration et hivernage des migrateurs terrestres




OBSERVATIONS DES PRINCIPAUX OISEAUX MIGRATEURS TERRESTRES EN FRANCE : TURDIDES ET PIGEON RAMIER

DE SEPTEMBRE 2015 A MARS 2016

(SYNTHESE DES RESULTATS DE 2011 A 2016 TOUTES ESPECES)

Source : Observatoire National Cynégétique et Scientifique Citoyen

Avec le soutien de la FNC, des FRC et des FDC de France.



Source ONCSC / ADCTG/E.CAMAIN

Analyses et rédaction J.-C. RICCI / IMPCF

Septembre 2016

INTRODUCTION

Comme pour chaque saison depuis 2010, l'équipe de l'Observatoire National (IMPCF et ADCTG) se fait un devoir d'analyser la base de données recueillie par les membres observateurs bénévoles afin d'en extraire les principaux résultats obtenus et de les transmettre aux participants ainsi qu'aux instances cynégétiques (FDC – FRC – FNC).

Depuis 5 ans, ces résultats sont le fruit de la contribution des chasseurs de France à la science participative et citoyenne qui se développe dans de nombreux autres domaines désormais.

Pour la saison 2015/2016 soit de septembre 2015 à mars 2016, les résultats s'appuient sur 5813 heures d'observations réparties sur 15 régions administratives (découpage ancien de 2015). Comme pour les saisons précédentes, l'indice utilisé est le nombre d'oiseaux observés par heure. Il porte en 2015/2016 sur 313 799 oiseaux observés.

RESULTATS ANNUELS DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE 2010/2011 A 2015/2016 (IMPCF - ADCTG)

	2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016	
	NOMBRE 125 110 oiseaux	INDICE (4) 2952 heures	NOMBRE 879 798 oiseaux	INDICE(4) 6037 heures	NOMBRE 754 393 oiseaux	INDICE(4) 6440 heures	NOMBRE 372 139 oiseaux	INDICE(4) 5680 heures	NOMBRE 474 421 oiseaux	INDICE(4) 5127 heures	NOMBRE 313799 oiseaux	INDICE(4) 5813 heures
ALOUETTE DES CHAMPS	2 750	0.9	14 089	2.3	15 046	2.3	22 060	3.9	16 474	3.2	7 550	1.3
CAILLE DES BLES (2)	42	*	137	*	121	*	67	*	49	*	20	0.0
ETOURNEAU	25 474	8.6	354 165	58.7	242 620	37.7	69 837	12.3	173 599	33.9	87 509	15.1
GRIVE DRAINE	8 608	2.9	4 339	0.7	7 931	1.2	4 117	0.7	7 773	1.5	7 478	1.3
GRIVE LITORNE	14 915	5.1	20 108	3.3	24 637	3.8	8 424	1.5	5 374	1.1	16 820	2.9
GRIVE MAUVIS	7 237	2.5	20 727	3.4	12 841	2.0	7 090	1.2	12 509	2.4	5 478	0.9
GRIVE MUSICIENNE	10 031	3.4	36 269	6.0	36 177	5.6	31 664	5.6	35 822	6.9	31 155	5.4
MERLE NOIR	3 331	1.1	8 889	1.5	8 255	1.3	5 008	0.9	10 319	2.0	8 372	1.4
PIGEON RAMIER	52 154	17.7	416 918	69.1	368 120	57.2	201 993	35.6	202 822	39.6	140 985	24.3
TOURTERELLE DES BOIS (3)	6	*	2 078	*	423	*	546	*	247	*	121	0.0
TOURTERELLE TURQUE	562	*	2 079	*	9 926	1.5	2 122	0.4	1 891	0.4	2 645	0.5
VANNEAU HUPPE (1)	*	*	*	*	28 840	4.5	19 278	3.4	7 542	1.5	5 666	1.0

(1) : espèce dénombrée seulement à partir de 2012/2013

(2) : protocole non adapté à cette espèce

(3) : période d'observation non adaptée à cette espèce


(4) INDICE = NB/heure = nombre d'oiseaux observés / nombre total d'heures d'observation de septembre à fin avril.

2010/2011 en gris car ce fut la première année de lancement du programme comme un test de faisabilité qui a ensuite permis des améliorations dans la saisie en ligne.

L'effort d'observation (5813 heures) se situe dans la moyenne des durées enregistrées depuis 2010 et le nombre total d'oiseaux observés inférieur à celui de la saison passée est de l'ordre de grandeur de celui calculé en 2013/2014. Les indices ainsi calculés situent toujours le pigeon ramier en premier, suivi de l'étourneau sansonnet, des Turridés et de l'Alouette des

champs. Le Vanneau huppé rajouté à la liste en 2012/2013 voit son indice diminuer en 2015/2016.

Pour les Turdidés le graphe ci-dessous illustre des différences entre les espèces et les années.



On peut distinguer trois espèces qualifiées de « stables » au regard de la valeur de l'indice relatif d'observation : grive draine, grive musicienne et merle noir, chez lesquels on constate les plus faibles variations interannuelles. En revanche la grive mauvis et la grive litorne, se déplaçant assez fréquemment ensemble en migration, révèlent les plus fortes variations comme l'augmentation pour la grive litorne en 2015/2016 après deux saisons de plus faible indice de 2013 à 2014. Pour la grive mauvis la diminution de l'indice global en 2015/2016 fait suite à la forte augmentation calculée la saison précédente. On peut qualifier ces deux espèces de « fluctuantes » et sans doute plus dépendantes des conditions météorologiques par opposition aux 3 précédentes considérées comme plus « stables » en termes de présence et/ou de migration en France.

LES PARTICIPANTS A L'OBSERVATOIRE NATIONAL

La répartition des 86 observateurs sur le territoire national couvre 15 Régions administratives de 2015 qui ont été transformées en 13 régions en 2016. Toutefois on note aussi et surtout une concentration

d'observations les samedis et dimanches ce qui rend les résultats d'autant plus fiables du fait de leur simultanéité à travers le territoire national.

La liste des participants ci-après est présentée à titre de remerciements pour leur contribution essentielle à l'Observatoire National (cette liste peut ne pas être complète en raison des éventuelles petites erreurs de saisie lors de l'inscription des membres sur le site. Merci de nous les signaler). Il convient de souligner et de féliciter le caractère bénévole de ce travail d'observations qui profite à l'ensemble des chasseurs français et fait avancer les connaissances sur ces espèces notamment sur les fluctuations inter annuelles de leur présence en automne et en hiver.



NOM	PRENOM	NOM	PRENOM	NOM	PRENOM
Allier	Fabien	gaillard	John	Narce	mathieu
arnaud	paul	Galinier	Fabien	NAVARRO	Charles
arnould	Fabien	gelot	bruno	PELCOT	Gérard
aso	michel	Gensolen	Fabrice	Pepino	Gilles
aubin	florent	GENY	Sylvain	PESCE	Pascal
AUROUSEAU	Gérard	gregoire	nicolas	Picot	alain
baccou	gregory	greter	mathieu	Pons	Eric
barege	philippe	guerrero	Jean	Portalis	Daniel
bernard	christian	Guillermin	Lucas	raineri	roger
Beroud	Timothée	Guillermin	Florian	Requin	André
bolzan	serge	ISCACHE	Jacques	RICCI	Jean-Claude
borel	nicolas	JOURDAN	MARC	Rieutort	Christophe
BOSCH	Cornélis	LAFONT	Jonathan	Rousset	Jean
BOUIS	Daniel	lagier	andre	roux	jacques
BOURRELLY	yves	LALANDE	François	Sagnes	Fabien
BRAUER	alain	LARRABURU	Bernard	SCHNEIDER	MIMISSE
brebion	damien	LASSELIN	Hugo	silvestrini	raymond
Camoin	Eric	LEGRY	nicolas	soullier	alain
cargnino	paul	LOMBARDOT	David	soumille	joel
Caron	Jean	lopez	joel	thiriau	philippe
chaix	christian	Lotte	Guy	toja	sébastien
Chandosné	charlette	manassero	robert	tonini	louis
cotencin	regis	Marimbordes	patrice	tron	claudé
daumas	henry	Martucci	Stephane	VAQUER	MARCEL
desserich	jean-luc	masson	Jacques	VERNIN	Jean-pierre
desserre	jerome	MAURICE	samuel		
Etienne	Fabrice	MEISSEL	MARC		
Faraud	Daniel	meynard	max		
faucou	jean-philipe	moroso	felix		
Fayet	nicolas	mutio	francois		
FLORENTINO	Jean-Paul				

REPARTITION DE L'EFFORT D'OBSERVATION ET DES PRINCIPALES ESPECES EN 2015-2016

Les résultats sont présentés par région dans la carte ci-dessous et exprimés en % du nombre d'observations pour la période (effort d'observation = % de 5813 heures).

Globalement on peut noter un effort d'observation plus conséquent dans le grand sud mais aussi au nord et au centre. Les grandes régions Ouest et Est ainsi que la Corse nous font encore défaut mais on ne désespère pas. Ajoutons que les régions Languedoc Roussillon et PACA totalisent à elles seules, plus de 70% des observations.



LES TURDIDES CHASSABLES :



Malgré la concentration de l'effort d'observation plutôt au sud de la France, on constate que les Turdides à l'exception de la grive musicienne et de la grive draine ont été en moyenne plus fréquemment observées au nord. Ce résultat est démonstratif pour la grive mauvis, la grive litorne et le merle noir. Les Régions Languedoc Roussillon et Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) où l'effort d'observation est le plus élevé et le plus régulier révèlent un indice des plus faibles quelle que soit l'espèce.

Certes les grands Turdids ont été présents partout en France si l'on en juge par la répartition géographique de la première classe de l'indice relatif d'abondance (moins de 5 observations par heure).

LE PIGEON RAMIER



Pour cette espèce l'absence d'observateurs dans l'Ouest, l'Est et en Corse nous prive d'interprétations plus fines. Le grand Sud-ouest reste la zone d'observation privilégiée du pigeon ramier mais on voit bien

l'immense couloir qui va du Nord Pas de Calais Picardie jusqu'en Midi Pyrénées en passant par Rhône Alpes. Soulignons un maintien en Région PACA d'un indice de 10 à 20 par heure comme en 2014/2015 grâce notamment à quelques jours de forts passages favorisés par des conditions anti cycloniques ayant favorisé des vents de Secteur Nord à Nord-Ouest (mistral et tramontane) en octobre 2015. Là encore l'absence d'observateurs en Corse nous prive d'une interprétation plus complète sur le couloir méditerranéen en provenance des alpes italiennes et françaises.

CONCLUSION

Ce rapport annuel s'est voulu synthétique et regroupant des analyses brutes, en réservant une analyse détaillée et comparative pour la fin de la saison prochaine qui portera sur 6 ans de suivi.

Poursuivons nos efforts pour convaincre l'ouest et l'est de la France incluant la Corse à participer activement à ce réseau national.

Nos membres étrangers (un en Espagne et un en Algérie) poursuivent leur contribution à la base de données mais ne semblent pas pouvoir rallier plus d'observateurs pour l'instant. Nous avons fait un effort de traduction du site en espagnol et en italien et avons diffusé l'information aux instances cynégétiques de ces deux pays. De même l'Association des Chasseurs Maltais a été destinataire d'une traduction en anglais qui devrait porter ses fruits lors de la saison qui commence.

Ajoutons enfin que la Société Naturapass qui travaille déjà avec de nombreuses Fédérations de Chasseurs a intégré un module spécial « Observatoire National » dans son application. Nous avons testé cette application qui rend la saisie des observations plus que rapide et conviviale sur le terrain. Nous pensons que les jeunes chasseurs seront particulièrement intéressés donc faites circuler l'information dans votre entourage.


📍 VOS INTERLOCUTEURS

Julien PARIS – Responsable des partenariats fédérations

Mobile : 06 62 56 05 40 – julien.paris@naturapass.com

Patrick BURDEYRON – Directeur Général

Mobile : 06 80 44 07 48 ou Bureau : 04 74 46 38 00 – patrick@naturapass.com



Un seul réflexe désormais et jusqu'à la fin mars 2017 :

<http://www.observatoirenationalmigrateurs.net>
[et/ou l'application smartphone de Naturopass](#)

Jean-Claude Ricci. Directeur scientifique de l'IMPCF.

Vergèze le 12 septembre 2016.

Observateur :

Age :

Département :

Mode de chasse :

Milieu type :

Si vous les connaissez : Latitude :

Adresse :

Commune d'observation :

N° validation du permis de chasser :

Mode de chasse :

Milieu type :

Si vous les connaissez : Longitude :

Tél. port :

Altitude : mètres

Date / /20	Grive musicienne	Grive mauvais	Grive draine	Grive litorne	Merle noir	Pigeon ramier	Alouette des champs	Étourneau sansonnnet	Vanneau huppé
Heure de début :									
Heure de fin :									
TOTAL									

METEOROLOGIE SIMPLIFIEE (Qualitative)

Température :
Froid ☐ Frais ☐ Doux ☐ Chaud ☐
Nul ☐ Faible ☐ Fort ☐
Vent : ☐ Provenant de :
Autres précisions :

Autres Espèces (nombre)

Temps sec ☐
Neige ☐
Pluie forte ☐
Pluie fine ☐
Brouillard-Brume ☐
Rosée ☐
Froid ☐ Doux ☐ Chaud ☐
Nul ☐ Faible ☐ Fort ☐
Vent : ☐ Provenant de :
Autres précisions :